

Профилактика ВИЧ-инфекции:

- безопасное и ответственное поведение, здоровый образ жизни
 - использование индивидуальных предметов личной гигиены
 - моногамия
 - тестирование на ВИЧ-инфекцию
 - отказ от наркотиков
 - использование презервативов при случайных половых контактах
 - соблюдение личной гигиены
 - раннее начало постконтактной профилактики заражения ВИЧ-инфекцией антиретровирусными препаратами (не позднее 72 часов).
- Профилактика вертикальной передачи ВИЧ-инфекции (от матери к ребенку) проводится с применением антиретровирусных препаратов.

Важно помнить!



**Скажем СПИДу:
«НЕТ»!**



Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
в Кирово-Чепецком районе
г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, 3а
Тел.: 8(83361) 4-83-73



ВИЧ и СПИД в чем разница?

Многие часто путают ВИЧ и СПИД, полагая, что это одно и то же. На самом же деле, различия существуют.

ВИЧ-инфекция представляет собой болезнь, вызванную вирусом иммунодефицита человека и являющуюся инфекционным хроническим заболеванием, характеризующимся специфическим поражением иммунной системы, приводящим к медленному ее разрушению до формирования синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), сопровождающегося развитием оппортунистических инфекций и вторичных злокачественных новообразований.

СПИД - состояние, развивающееся на фоне ВИЧ-инфекции и характеризующееся появлением одного или нескольких заболеваний, отнесенных к СПИД-индикаторным.

Источником ВИЧ-инфекции являются люди, инфицированные ВИЧ, на любой стадии заболевания, в том числе в инкубационном периоде. Инфицирование ВИЧ является пожизненным.

Определения

ВИЧ:

Вирус
Иммунодефицита
Человека

СПИД:

Синдром
Приобретенного
Иммуно-
Дефицита



Пути передачи ВИЧ-инфекции:

- контактный путь (преимущественно при половых контактах и при контакте слизистой или раневой поверхности с кровью)
- вертикальный путь (инфицирование ребенка от ВИЧ-инфицированной матери: во время беременности, в родах и при грудном вскармливании)
- искусственный путь (при немедицинских инвазивных процедурах, в том числе внутривенном введении наркотиков (использование шприцев, игл, другого инъекционного оборудования и материалов), нанесении татуировок, при проведении косметических, маникюрных и педикюрных процедур нестерильным инструментарием, других контактах с нарушением целостности кожных покровов; при инвазивных вмешательствах в медицинской организации).

Инфицирование ВИЧ может осуществляться при переливании крови, ее компонентов и препаратов, пересадке органов и тканей, использовании донорской спермы, донорского грудного молока от ВИЧ-инфицированного донора).

Группы риска по ВИЧ-инфекции:

- потребители инъекционных наркотиков и половые партнеры потребителей инъекционных наркотиков
- лица, занимающиеся проституцией и клиенты лиц, занимающихся проституцией
- лица, практикующие гомосексуальные половые контакты
- лица, заключенные под стражу
- беспризорные дети
- лица, имеющие несколько половых партнеров
- работники, деятельность которых связана с передвижением по территории Российской Федерации
- люди, злоупотребляющие алкоголем и неинъекционными наркотиками

